

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Glycerinzäpfchen Rösch

Wirkstoff: Glycerol 85 % (= Glycerin)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Medizinproduktes beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Wenden Sie dieses Medizinprodukt immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3-4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Glycerinzäpfchen Rösch und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Glycerinzäpfchen Rösch beachten?
3. Wie sind Glycerinzäpfchen Rösch anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Glycerinzäpfchen Rösch aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Glycerinzäpfchen Rösch und wofür werden sie angewendet?

Glycerinzäpfchen Rösch sind Zäpfchen zum Einführen in den After zur Behandlung von Stuhlverstopfung. Zur Regulierung des Stuhlganges, wenn ein leichter Abgang besonders erwünscht ist: z.B. bei Hämorrhoidalleiden, bei längerer Bettlägerigkeit, bei alten Menschen und Kindern, nach Operationen, wenn Anstrengungen beim Stuhlgang vermieden werden müssen oder in der Schwangerschaft und Stillperiode, wenn andere Mittel nicht angewendet werden sollen.

Glycerol wirkt wasseranziehend und regt daher die Schleimhaut des Enddarms zur Wasserabgabe an, wodurch der eingedickte Inhalt gleitfähig wird. Die gleichzeitige Volumensvergrößerung löst nach kurzer Zeit den Stuhlentleerungsreflex aus.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Glycerinzäpfchen Rösch beachten?

Besonders bei Säuglingen und Kleinkindern sollte die Dosierung (1g-Zäpfchen) beachtet werden und im Falle anhaltender Störungen der Darmtätigkeit stets die Abklärung der Ursache im Vordergrund stehen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Besonders bei Säuglingen und Kleinkindern sollte die Dosierung (1g-Zäpfchen) beachtet werden und im Falle anhaltender Störungen der Darmtätigkeit stets die Abklärung der Ursache im Vordergrund stehen.

Bisher sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt geworden. Es ist aber keinesfalls empfehlenswert, die Behandlung über längere Zeit regelmäßig durchzuführen, ohne die Ursachen der Darmträgheit ärztlich abklären zu lassen. In Fällen chronischer Verstopfung sollte auch eine natürliche Darmregulierung mit faserreicher Kost (Obst, Gemüse) und ausreichender Flüssigkeitszufuhr angestrebt werden.

Anwendung von Glycerinzäpfchen Rösch zusammen mit anderen Medikamenten

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden. In hartnäckigen und schweren Fällen von Verstopfung kann es u.U. zweckmäßig sein, am Vorabend (eventuell nach Rücksprache mit dem Arzt) ein nicht sofort wirkendes Abführmittel einzunehmen und am Morgen ein Glycerinzäpfchen Rösch anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Bei einer sachgemäßen Anwendung sind keine Schäden zu erwarten.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Glycerinzäpfchen Rösch haben keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. Wie sind Glycerinzäpfchen Rösch anzuwenden?

Wenden Sie dieses Medizinprodukt immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Säuglinge und Kleinkinder (28 Tage bis 23 Monate): 1 Zäpfchen zu 1 Gramm
Kinder ab 2 Jahren, Jugendliche und Erwachsene: 1 Zäpfchen zu 2 Gramm
Erwachsene (ab 18 Jahren) in hartnäckigen Fällen: 1 Zäpfchen zu 3 Gramm

Anwendung am besten morgens kurz vor dem Aufstehen. Zäpfchen aus der Hülle nehmen und in den After einführen. Die Wirkung setzt nach kurzer Zeit (15-60 min) ein. Gegebenfalls sollte man nach Einführen des Zäpfchens die Entleerung etwas hinhalten, damit eine ausreichende Erweichung der verhärteten Stuhlmassen stattfinden kann.

Wenn Sie eine größere Menge von Glycerinzäpfchen Rösch angewendet haben, als Sie sollten

Eine Überdosierung ist bei korrekter Handhabung kaum denkbar. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Medizinproduktes haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Anwendung von Glycerinzäpfchen Rösch vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bisher keine bekannt. Wie alle Medikamente können Glycerinzäpfchen Rösch Nebenwirkungen haben, die nicht bei jedem auftreten müssen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Medizinproduktes zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Glycerinzäpfchen Rösch aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Medizinprodukt nach dem auf dem Umkarton/dem Blisterstreifen nach "Verwendbar bis" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Medizinprodukt zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Glycerinzäpfchen Rösch enthalten:

Der Wirkstoff ist Glycerol 85 %

Ein 3g Zäpfchen enthält 2,49g wasserfreies Glycerin

Ein 2g Zäpfchen enthält 1,66g wasserfreies Glycerin

Ein 1g Zäpfchen enthält 0,83g wasserfreies Glycerin

Die sonstigen Bestandteile sind: Stearinsäure, Natriumhydroxid, Wasser.

Wie Glycerinzäpfchen Rösch aussehen und Inhalt der Packung

Milchigweiße, durchscheinende Zäpfchen in einer Ziehfolie aus Kunststoff zu je 10 Zäpfchen.

Hersteller: Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H., 6067 Absam/Tirol

Vertrieb: BANO Healthcare GmbH, 6580 St. Anton/Arberg, www.bano-healthcare.at. Rösch& Handel ist eine Marke der BANO Healthcare GmbH.

Packungsgrößen:

10 und 100 Zäpfchen zu 1 Gramm

10 und 100 Zäpfchen zu 2 Gramm

10 und 100 Zäpfchen zu 3 Gramm

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2015