DE | EN | FR | IT

DE GEBRAUCHSINFORMATION

SILVERIN® STICKS

Silbernitrat Ätzstäbchen

V5255

MD MEDIZINPRODUKT

ZWECKBESTIMMUNG
SILVERIN® STICKS sind Ätzstäbchen aus Holz oder Kunststoff, an deren Ende eine Mischung aus Silbernitrat und Kaliumnitrat aufgebracht ist. Durch Zuführen von Feuchtigkeit werden die Ätzstäbchen einsatzbereit. SILVERIN® STICKS ermöglichen eine einfache, punktuelle Handhabung, sodass die Wirkung auf genau begrenzte Stellen beschränkt bleibt.

SILVERIN® wird zur chemischen Kauterisierung bei oberflächlichen Blutungen, bei Nasenbluten, zur Behandlung von Warzen, von Schleimhautläsionen im Mund- und Genitalbereich und bei überschießender Wundgranulation (wildes Fleisch) angewendet. Weitere Anwendungsbereiche sind aphthöse Stomatitis, Entfernung von Nabelschnurresten sowie der Einsatz im Wundmanagement, z.B. bei der Stomaversorgung.

WANN DÜRFEN SILVERIN® STICKS NICHT ANGEWENDET WERDEN?
SILVERIN® STICKS dürfen nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Silbernitrat oder Kaliumnitrat sind.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:
- Bei allen ungewöhnlich gefärbten oder geformten Hautveränderungen, die nicht eindeutig als einfache Warze zu erkennen sind, sollten SILVERIN® STICKS nur unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden.
- Den Kopf des Ätzstäbchens nicht mit feuchten Händen anfassen.
- Schützen Sie Ihre Kleidung und andere Gegenstände beim Hantieren mit dem Ätzstäbchen. Silbernitrat führt zu braunschwarzen Flecken, welche sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht entfernen lassen.
- Gesunde Haut, die ungewollt mit dem Kopf des Ätzstäbchens berührt wurde, gründlich mit fließendem Wasser und Schwamm reinigen. Es kann dennoch zu einer harmlosen Dunkelfärbung dieser Hautstellen kommen. Die Dunkelfärbung verblasst nach etwa 10–14 Tagen.
- Sollte das Ätzstäbchen mit dem Auge in Berührung gekommen sein, sofort bei geöffnetem Lid unter fließendem Wasser mindestens 5 Minuten durchgehend spülen und danach einen Arzt konsultieren.
- Bei einer Anwendung im Bereich des Mundes ist unbedingt darauf zu achten, dass es zu keinem Verschlucken von Teilen des Köpfchens kommt. Bei Verschlucken sollte umgehend ein Arzt konsultiert werden.
- Die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren sollte nur durch medizinisches Fachpersonal erfolgen.
- Für die Behandlung von Nasenbluten bei Kindern oder eines Nabelgranuloms wird die Verwendung von SILVERIN® STICKS 50% empfohlen, um eine zu starke Kauterisierung zu vermeiden.
- Generell wird bei Anwendungen in der Nase empfohlen, immer nur ein Nasenloch zu behandeln und erst im Abstand von rund 3 Wochen – sofern erforderlich – das zweite Nasenloch.

SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT
Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Medizinproduktes Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

WECHSELWIRKUNGEN
Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

VERKEHRSTÜCHTIGKEIT
Die Anwendung von SILVERIN® STICKS hat keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit.

WIE SIND SILVERIN® STICKS ANZUWENDEN?
Wenden Sie dieses Medizinprodukt immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben an. Fragen Sie bei Unsicherheiten Ihren Arzt und Apotheker.

Jeweils nur die betroffene Stelle punktuell behandeln.

Kopf des Ätzstäbchens mit 1–2 Tropfen sauberem Wasser befeuchten. Verwenden Sie keine salzhaltigen Lösungen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit vom Stäbchen auf die Umgebung tropft, da dies zu Flecken führen kann, die sich nicht mehr entfernen lassen. Die zu behandelnde Stelle punktgenau und gleichmäßig 1–2 Sekunden lang sanft betupfen oder das Stäbchen an der Stelle rollen. Nicht zu fest aufdrücken, um ein Zerbrechen des Köpfchens zu vermeiden.

Die Stäbchen sind zur einmaligen Anwendung bestimmt. Ein mehrmaliges Verwenden könnte ein Infektionsrisiko darstellen.

Warzenentfernung:
Die Laienanwendung sollte nur von Erwachsenen vorgenommen werden. Es ist darauf zu achten, dass SILVERIN® nur punktgenau angewandt wird.

Die behandelte Stelle verfärbt sich meist nicht sofort, jedoch innerhalb von 24 Stunden braunschwarz und wird dann über einige Tage hinweg vom umgebenden Gewebe abgestoßen. Beobachten Sie die Veränderung und wiederholen Sie die Behandlung bei Bedarf alle 2–3 Tage. Beenden Sie die Behandlung nach längstens 14 Tagen. Sollte sich keine Besserung zeigen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Die Behandlung ist schmerzfrei.

Zu häufige Anwendungen (ohne Veränderungen abzuwarten) können zu Reizerscheinungen oder entzündlichen Reaktionen führen. In solchen Fällen sollte man vor weiteren Anwendungen ärztlichen Rat einholen.

Behandlung von Blutungen, Wunden, überschießender Wundgranulation, aphtöser Stomatitis und Nabelschnurresten:
Diese Anwendungen sollten ausschließlich von Ärzten und Fachpersonal durchgeführt werden.

Die behandelte Stelle färbt sich rasch grau. Es kann ein Brennen während der Behandlung spürbar sein. Meist ist eine Anwendung ausreichend.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?
Es können Überempfindlichkeitsreaktionen oder lokale Reizungen der Haut wie Jucken, leichtes Brennen, Rötungen sowie Bläschen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage angegeben sind. Bei schwerwiegenden Vorfällen kontaktieren Sie den Hersteller sowie die in Ihrem Land zuständige Gesundheitsbehörde.

WIE SIND SILVERIN® STICKS AUFZUBEWAHREN UND ZU ENTSORGEN?
Bitte in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Die Packung trocken aufbewahren.
Nach Öffnen der Verpackung diese bis zur weiteren Verwendung verschließen. Die Köpfe der Stäbchen sind erst weißlich, können sich jedoch mit der Zeit dunkel verfärben. Diese Verfärbung hat keinen Einfluss auf die Wirkung des Produktes. Bewahren Sie dieses Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf. Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr nach Ablauf des Verfallsdatums. Das Verfallsdatum finden Sie auf der Verpackung. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Haushaltsabfall. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

INHALT DER PACKUNG/PACKUNGSGRÖßEN
Die Verpackung beinhaltet Ätzstäbchen aus Holz (starr) oder Kunststoff (elastisch) mit 50% Silbernitrat und 50% Kaliumnitrat (SILVERIN® STICKS 50%) oder 75% Silbernitrat und 25% Kaliumnitrat (SILVERIN® STICKS 75%).

Erhältlich in unterschiedlichen Packungsgrößen mit unterschiedlichen Wirkstoffkonzentrationen.

10 und 100 Stück mit 115mm Länge und
10 und 100 Stück mit 200mm Länge

SILVERIN® STICKS sind in den Varianten elastisch und starr erhältlich.

ZUSAMMENSETZUNG
SILVERIN® STICKS 50%:
50% Silbernitrat und 50% Kaliumnitrat
SILVERIN® STICKS 75%:
75% Silbernitrat und 25% Kaliumnitrat

HERSTELLER
BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17, 2500 Baden, Österreich, www.bano.at

Nähere Informationen entnehmen Sie unserer Homepage www.bano.at.

Rösch & Handel ist eine Marke der BANO Healthcare GmbH.

CH REP
Runge Med AG, Saint-Louis-Str. 31, 4056 Basel

STAND DER GEBRAUCHSINFORMATION: Mai 2025

Die Gebrauchsanweisung ist auch elektronisch (als Download) verfügbar unter www.bano.at.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback zum Produkt.

MD Medizinprodukt
Hersteller
Verwendbar bis
LOT Charge
REF Artikelnummer
Vor Sonnenlicht schützen
Trocken aufbewahren
Nicht wiederverwenden
www.bano.at (Elektronische) Gebrauchsanweisung beachten
Achtung!

EN INSTRUCTIONS FOR USE

SILVERIN® STICKS

Silver Nitrate Caustic Sticks

MD MEDICAL DEVICE

INTENDED PURPOSE
SILVERIN® STICKS are caustic sticks made of wood or plastic with a mixture of silver nitrate and potassium nitrate attached to the end. By adding moisture, the caustic sticks become ready for use. SILVERIN® STICKS enable simple, punctual handling so that the effect is limited to precisely defined areas.

SILVERIN® is used for chemical cauterization in the case of superficial bleeding, nosebleeds, for the treatment of warts, mucous membrane lesions in the oral and genital areas and for excessive wound granulation (proud flesh). Further areas of application include aphthous stomatitis, removal of umbilical cord residues and use in wound management, e.g. in stoma care.

WHEN SHOULD SILVERIN® STICKS NOT BE USED?
SILVERIN® STICKS must not be used if you are allergic to silver nitrate or potassium nitrate.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:
- SILVERIN® STICKS should only be used under medical supervision for all unusually discolored or unusually shaped skin changes that cannot be clearly identified as simple warts.
- Do not touch the head of the caustic stick with wet hands.
- Protect your clothing and other objects when handling the caustic stick. Silver nitrate causes brown-black stains that cannot be removed with conventional cleaning agents.
- Clean healthy skin that has been accidentally touched with the head of the caustic stick thoroughly with running water and a sponge. However, a harmless darkening of these areas of skin may still occur. The dark colour fades after about 10–14 days.
- If the caustic stick comes into contact with the eye, rinse immediately with the eyelid open under running water for at least 5 minutes and consult a doctor.
- If used in the mouth, it is essential to ensure that no parts of the head are swallowed. If swallowed, a doctor should be consulted immediately.
- Use in children under 3 years of age should only be carried out by specialised medical personnel.
- For the treatment of nosebleeds in children or an umbilical granuloma, the use of SILVERIN® STICKS 50% is recommended to avoid excessive cauterisation.
- In general, it is recommended to treat only one nostril at a time and only treat the second nostril after around 3 weeks, if necessary.

PREGNANCY AND BREASTFEEDING
If you are pregnant or breastfeeding or if you suspect that you are pregnant or intend to become pregnant, consult your doctor or pharmacist before using this medical device.

INTERACTIONS
There are no known interactions.

EFFECTS ON THE ABILITY TO DRIVE
The use of SILVERIN® STICKS does not affect the ability to drive.

HOW SHOULD SILVERIN® STICKS BE USED?
Always use this medical device exactly as described in this package leaflet. Ask your doctor and pharmacist if you are unsure.

Only treat small areas of skin at a time.

Moisten the head of the caustic sticks with 1–2 drops of clean water. Do not use saline solutions. Make sure that no liquid drips from the stick onto the surrounding area, as this can lead to stains that can't be removed. Gently dab the area to be treated precisely and evenly for 1–2 seconds or roll the stick over the area. Do not press too hard to avoid breaking the head.

The caustic sticks are intended for single use. Repeated use could pose a risk of infection.

Wart removal:
Lay application should only be carried out by adults. Make sure that SILVERIN® is only applied precisely.

The treated area does not usually turn brown-black immediately, but within 24 hours and is then shed from the surrounding tissue over a few days. Observe the changes and repeat the treatment every 2–3 days if necessary. Finish the treatment after a maximum of 14 days. If there is no improvement, consult a doctor. The treatment is painless.

Too frequent applications (without waiting for changes) can lead to irritation or inflammatory reactions. In such cases you should seek medical advice before further applications.

Treatment of bleeding, wounds, excessive wound granulation, aphtous stomatitis and umbilical cord residues:
These applications should only be carried out by doctors and specialised personnel.

The treated area quickly turns grey. A burning sensation may be felt during treatment. One application is usually sufficient.

WHAT SIDE EFFECTS ARE POSSIBLE?
Hypersensitivity reactions or local irritation of the skin such as itching, slight burning, redness and blisters may occur. If you notice any side effects, consult your doctor or pharmacist. This also applies to side effects that are not listed in the package insert. In the event of serious incidents, contact the manufacturer and the health authority responsible in your country.

HOW SHOULD SILVERIN® STICKS BE STORED AND DISPOSED OF?
Please keep the applicators in the original packaging to protect them from light. Store the package in a dry place. Store below 30°C.

After opening the package close it well until further use. The heads of the sticks are whitish at first, but may darken in colour over time. This discolouration has no influence on the effect of the product. Keep this medical device out of the reach of children. Do not use this product after the expiry date. The expiry date can be found on the packaging.

Do not dispose of this product in household waste. This helps to protect the environment.

CONTENTS OF THE PACKAGE/PAKCAGE SIZES
The package contains caustic sticks made of wood (rigid) or plastic (elastic) with 50% silver nitrate and 50% potassium nitrate (SILVERIN® STICKS 50%) or 75% silver nitrate and 25% potassium nitrate (SILVERIN® STICKS 75%).

Available in different package sizes with different active ingredient concentrations.

10 and 100 pcs./115 mm, 4.5" in length;
10 and 100 pcs./200 mm, 7.9" in length

SILVERIN® STICKS are available in flexible and rigid versions.

COMPOSITION
SILVERIN® STICKS 50%:
50% silver nitrate and 50% potassium nitrate
SILVERIN® STICKS 75%:
75% silver nitrate and 25% potassium nitrate

MANUFACTURER
BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17, 2500 Baden, Austria, www.bano.at

Further information can be found on our homepage www.bano.at.

Rösch & Handel is a brand of BANO Healthcare GmbH.

CH REP
Runge Med AG, Saint-Louis-Str. 31, 4056 Basel

VERSION OF THE INSTRUCTIONS FOR USE:
May 2025

The instructions for use are also available electronically (as a download) at www.bano.at.

We look forward to your feedback on the product.

MD Medical device
Manufacturer
Use-by date
LOT Batch code
REF Article Number
Keep away from sunlight
Keep dry
Do not re-use
www.bano.at Consult (electronic) instructions for use
Caution!

FR NOTICE D´UTILISATION

SILVERIN® STICKS

Crayons caustiques au nitrate d'argent

MD DISPOSITIF MÉDICAL

DÉFINITION
Les SILVERIN® STICKS sont des crayons en bois ou en plastique, à l'extrémité desquels est appliqué un mélange de nitrate d'argent et de nitrate de potassium. En ajoutant de l'humidité, les crayons au nitrate d´argent deviennent prêts à l'emploi. Les SILVERIN® STICKS permettent une manipulation simple et ponctuelle, de sorte que l'action de l´application se limite à des endroits bien délimités.

SILVERIN® est utilisé pour la cautérisation chimique en cas de saignements superficiels, en cas de saignements de nez, pour le traitement des verrues, des lésions des muqueuses dans la région buccale et génitale et en cas de granulation excessive des plaies (hypergranulation). D'autres domaines d'application sont stomatite aphteuse, l'ablation de restes de cordon ombilical ainsi que l'utilisation dans la gestion des plaies, par exemple pour le traitement des stomies.

QUAND NE PAS UTILISER LES SILVERIN® STICKS ?
Si vous êtes allergique au nitrate d'argent ou au nitrate de potassium.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS :
- En cas de toute coloration ou forme inhabituelle de la peau, qui ne peut être clairement identifiée comme une verrue simple, les SILVERIN® STICKS ne doivent être utilisés que sous contrôle médical.
- Ne pas toucher la tête du crayon directement avec les mains humides.
- Protégez vos vêtements et autres objets lors de la manipulation avec le crayon au nitrate d´argent. Le nitrate d'argent provoque des taches brunes-noires qui ne peuvent pas être éliminées avec des produits de nettoyage conventionnels.
- Si de la peau saine a été touchée involontairement par la tête du crayon, rincer abondamment à l'eau courante avec une éponge. Il peut toutefois se produire une coloration foncée inoffensive de ces zones de peau. La coloration foncée s'estompe au bout de 10 à 14 jours.
- Si le crayon au nitrate d´argent entre en contact avec l'oeil, rincez immédiatement sous l'eau courante en gardant les paupières ouvertes pendant au moins 5 minutes, puis consultez un médecin.
- En cas d'application dans la bouche, il faut absolument veiller à ce qu'il n'y ait pas de l'ingestion d'une partie de la tête du crayon. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- L'utilisation chez les enfants de moins de 3 ans doit être uniquement effectuée par du personnel médical qualifié.
- Pour le traitement des saignements de nez chez les enfants ou d'un granulome ombilical, il est conseillé d'utiliser de SILVERIN® STICKS 50% pour éviter une cautérisation trop importante.
- En règle générale, il est recommandé de ne traiter qu'une seule narine à la fois et de ne traiter la deuxième narine qu'à environ trois semaines d'intervalle, si nécessaire.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, ou si vous pensez être enceinte ou avez l'intention de l'être, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce produit.

INTERACTIONS
Il n'y a pas d'interactions connues.

APTITUDE À CIRCULER EN VOITURE
L'utilisation de SILVERIN® STICKS n'a aucun effet sur la sécurité routière ou sur l'aptitude à conduire des véhicules.

COMMENT UTILISER SILVERIN® STICKS ?
Utilisez toujours ce dispositif médical exactement comme décrit dans cette notice. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
Ne traiter que ponctuellement la zone concernée.
Humidifier la tête du crayon avec 1–2 gouttes d'eau propre. Ne pas utiliser de solution saline. Veiller à ce qu'aucun liquide ne s'écoule du crayon sur les surfaces environnantes, car cela pourrait provoquer des taches qui ne pourraient plus être enlevées. Appliquer précisément et uniformément sur la zone à traiter pendant 1 à 2 secondes ou faire rouler le crayon sur la zone.
Ne pas appuyer trop fort afin de ne pas casser la tête. Les crayons sont à usage unique. Une utilisation répétée pourrait entraîner un risque d'infection.

Élimination des verrues :
L'utilisation par des non-professionnels doit être réservée aux adultes. Il convient de veiller à ce que SILVERIN® ne soit appliqué que sur un point précis.
La zone traitée ne change généralement pas de couleur immédiatement après l'application, mais dans les 24 heures, elle devient brune-jaune. Puis elle est rejetée par les tissus environnants en quelques jours. Observez et répétez le traitement tous les 2–3 jours si nécessaire. Arrêtez le traitement au bout de 14 jours maximum. Si aucune amélioration n'est constatée, consultez votre médecin. Le traitement est indolore.
Des applications trop fréquentes (sans attendre de changement) peuvent provoquer des irritations ou des réactions inflammatoires. Dans de tels cas, il est conseillé de consulter un médecin avant de poursuivre les applications.

Traitement des hémorragies, des plaies, des granulations excessives des plaies, de la stomatite aphteuse et des restes de cordon ombilical :
Ces applications doivent être effectuées exclusivement par des médecins et du personnel spécialisé.

La zone traitée devient rapidement grise. Il est possible qu´une sensation de brûlure peut être ressentie pendant le traitement. En général, une seule application est suffisante.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES ?
Des réactions d'hypersensibilité ou des irritations locales de la peau comme des démangeaisons, de légères sensations de brûlure, des rougeurs ainsi que des vésicules peuvent apparaître. Si vous remarquez des effets secondaires, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Cela vaut également pour les effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans la notice. En cas d'incidents graves contactez le fabricant ainsi que l'autorité de santé de votre pays.

COMMENT CONSERVER ET ÉLIMINER LES SILVERIN® STICKS ?
Veuillez les conserver dans leur emballage d'origine afin de les protéger de la lumière. Garder l'emballage et conserver les dans un endroit sec.
Après ouverture, assurez-vous que l´emballage soit bien refermer jusqu'à ce qu'à la prochaine utilisation. Les têtes des crayons sont d'abord blanchâtres, mais peuvent noircir avec le temps. Cette coloration n'a aucune influence sur l'efficacité du produit. Conservez ce dispositif médical dans un endroit hors de portée des enfants. Ne pas utiliser ce produit après la date de péremption. Vous trouverez la date de péremption sur l'emballage.
Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Vous contribuez ainsi à la protection de l'environnement.

CONTENU DE ' L´EMBALLAGE / TAILLES D´EMBALLAGE
L'emballage contient des crayons au nitrate d´argent en bois (rigides) ou en plastique (flexibles) contenant 50% de nitrate d'argent et 50% de nitrate de potassium (SILVERIN® STICKS 50%) ou 75% de nitrate d'argent et 25% de nitrate de potassium (SILVERIN® STICKS 75%).

Disponible en différentes tailles d'emballage avec différentes concentrations de substances actives :

10 et 100 pièces de 115mm de longueur et
10 et 100 pièces de 200mm de longueur

Les SILVERIN® STICKS sont disponibles en version flexibles et rigides.

COMPOSITION
SILVERIN® STICKS 50% :
50% de nitrate d'argent et 50% de nitrate de potassium
SILVERIN® STICKS 75% :
75% de nitrate d'argent et 25% de nitrate de potassium

FABRICANTS
BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17, 2500 Baden, Autriche, www.bano.at

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre page d'accueil www.bano.at.

Rösch & Handel est une marque de BANO Healthcare GmbH.

CH REP
Runge Med AG, Saint-Louis-Str. 31, 4056 Bâle

ÉTAT DE LA NOTICE D'UTILISATION : Mois Année

'La notice d´utilisation est également disponible sous forme électronique (à télécharger) sur www.bano.at.

Nous attendons avec impatience vos commentaires sur le produit.

MD Dispositif médical
Fabricant
Date de péremption
LOT Code du lot
REF Code du produit
Conserver à l'abri de la lumière
Conserver au sec
Ne pas réutiliser
www.bano.at Consulter la notice d'utilisation (électronique)
Avertissement!

IT ISTRUZIONI PER L´ USO

SILVERIN® STICKS

Matite caustiche al nitrato d'argento

MD DISPOSITIVO MEDICO

DESTINATION
I SILVERIN® STICKS sono matite caustiche in legno o plastica con all'estremità una miscela di nitrato d'argento e nitrato di potassio. Inumidendole diventano pronte per l'uso. I SILVERIN® STICKS sono di facile e precisa applicazione e fanno si che l'effetto sia limitato ad aree precisamente definite.

SILVERIN® è usato per la cauterizzazione chimica di emorragie superficiali, epistassi, trattamento di verruche, lesioni delle mucose della bocca e della zona genitale e granulazione (tessuto di granulazione) eccessiva delle ferite. Altre aree di applicazione sono la stomatite aftosa, la rimozione di residui di cordone ombelicale e la gestione delle ferite, ad esempio la cura della stomia.

QUANDO NON SI DEVONO USARE I SILVERIN® STICKS?
SILVERIN® STICKS non deve essere utilizzato in caso di allergia al nitrato d'argento o al nitrato di potassio.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:
- SILVERIN® STICKS deve essere utilizzato solo sotto controllo medico per tutte le alterazioni cutanee di colore o forma insolita che non possono essere chiaramente identificate come semplici verruche.
- Non toccare la punta della matita caustica con le mani bagnate.
- Proteggere gli indumenti e gli altri oggetti quando si usa la matita caustica. Il nitrato d'argento provoca macchie nere e marroni che non possono essere rimosse con i detergenti tradizionali.
- Lavare accuratamente con acqua e una spugna la pelle sana entrata involontariamente in contatto con la punta della matita caustica. Tuttavia, queste aree cutanee potrebbero essere soggette a un cambiamento di pigmentazione innocuo diventando più scure. Questa colorazione scura svanisce dopo circa 10–14 giorni.
- Se la matita caustica viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente la palpebra aperta sotto l'acqua corrente per almeno 5 minuti e poi consultare un medico.
- Quando si applica nell'area della bocca, è essenziale assicurarsi che le parti della punta non vengano ingerite. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.
- Il trattamento di bambini al di sotto dei 3 anni deve essere effettuato solo da personale sanitario.
- Per il trattamento di epitassi nei bambini o di granuloma ombelicale, si raccomanda l'uso di SILVERIN® STICKS 50% per evitare una cauterizzazione eccessiva.
- In generale, si consiglia di trattare una sola narice alla volta e di trattare la seconda narice solo a distanza di circa 3 settimane, se necessario.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Se è in corso una gravidanza o un allattamento, o se si sospetta di essere incinta o se si ha intenzione di diventarlo, chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI
Non sono note interazioni con altri farmaci.

IDONEITÀ ALLA GUIDA
L'uso di SILVERIN® STICKS non influisce sulla capacità di guidare.

COME SI USANO I SILVERIN® STICKS?
Utilizzare sempre questo dispositivo medico esattamente come descritto nel presente foglietto illustrativo. Chiedere al medico e al farmacista se non siete sicuri.

Trattare solo l'area interessata.

Inumidire la punta della matita caustica con 1–2 gocce di acqua pulita. Non utilizzare soluzioni saline. Assicurarsi che il liquido non goccioli dalla matita sull'area circostante, in quanto ciò può causare macchie che non possono essere rimosse. Tamponare delicatamente la zona da trattare in modo preciso e uniforme per 1–2 secondi o far ruotare lo stick sulla zona. Per evitare di rompere la punta non premere troppo.

Le matite caustiche sono destinate all'uso singolo. L'uso ripetuto potrebbe comportare un rischio di infezione.

Rimozione delle verruche:
In mancanza di personale medico, l'uso deve essere effettuato solo da persone adulte. È necessario prestare attenzione affinché SILVERIN® venga applicato solo con precisione millimetrica.

L'area trattata di solito non perde immediatamente il proprio colore, ma entro 24 ore diventa marrone-nera e viene poi rigettata dal tessuto circostante nell'arco di alcuni giorni. Osservare il cambiamento e ripetere il trattamento ogni 2–3 giorni, se necessario. Interrompere il trattamento dopo un massimo di 14 giorni. Se non ci sono miglioramenti, consultare il medico. Il trattamento è indolore.

Applicazioni troppo frequenti (senza attendere i cambiamenti) possono provocare irritazioni o reazioni infiammatorie. In questi casi, si consiglia di consultare un medico prima di proseguire l'uso.

Trattamento di emorragie, ferite, eccessiva granulazione delle ferite, stomatiti aftose e residui di cordone ombelicale:
Questi trattamenti devono essere eseguiti solo da medici e personale specializzato.

L'area trattata diventa rapidamente grigia. Durante il trattamento si può avvertire una sensazione di bruciore. Di solito è sufficiente una sola applicazione.

QUALI SONO GLI EFFETTI INDESIDERATI?
Possono verificarsi reazioni di ipersensibilità o irritazioni locali della pelle come prurito, leggero bruciore, arrossamento e vesciche. Se si manifestano degli effetti indesiderati, rivolgersi al medico o al farmacista. Questo vale anche per gli effetti indesiderati che non sono menzionati in questo foglietto illustrativo. In caso di incidenti gravi, contattare il produttore e l'autorità sanitaria competente del proprio paese.

COME DEVONO ESSERE CONSERVATI E SMALTITI I SILVERIN® STICKS?
Conservare nella confezione originale per proteggere il contenuto dalla luce. Conservare la confezione in un luogo asciutto.

Dopo l'apertura della confezione, sigillarla fino al successivo utilizzo. Le punte delle matite caustiche sono inizialmente biancastre, ma possono scurirsi nel tempo. Questa decolorazione non influisce sull'effetto del prodotto. Tenere questo dispositivo medico fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza è riportata sulla confezione.

Non smaltire questo prodotto nei rifiuti domestici. In questo modo, si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE/DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE
La confezione contiene matite caustiche in legno (rigide) o in plastica (elastiche) con 50% di nitrato d'argento e 50% di nitrato di potassio (SILVERIN® STICKS 50%) o 75% di nitrato d'argento e 25% di nitrato di potassio (SILVERIN® STICKS 75%).

Le confezioni sono disponibili in diverse dimensioni con diverse concentrazioni di principio attivo.

10 e 100 pezzi con lunghezza 115 mm e
10 e 100 pezzi con lunghezza 200 mm

I SILVERIN® STICKS sono disponibili in versione elastica e rigida.

COMPOSIZIONE:
SILVERIN® STICKS 50%:
50% di nitrato d'argento e 50% di nitrato di potassio
SILVERIN® STICKS 75%:
75% di nitrato d'argento e 25% di nitrato di potassio

PRODUTTORE
BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17, 2500 Baden, Austria, www.bano.at

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla nostra homepage www.bano.at.

Rösch & Handel è un marchio di BANO Healthcare GmbH.

CH REP
Runge Med AG, Saint-Louis-Str. 31,4056 Basilea

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PER L'USO: Maggio 2025

Le istruzioni per l'uso sono disponibili anche in formato elettronico (scaricabile) all'indirizzo www.bano.at.

Attendiamo con piacere il vostro feedback sul prodotto.

MD Dispositivo medico
Produttore
Data di scadenza
LOT Lotto
REF Codice del prodotto
Conservare lontano dai raggi solari
Conservare in un luogo asciutto
Non riutilizzare
www.bano.at Vedere le istruzioni per l'uso (elettroniche)
Precauzioni!